



NOUVELLES DE L'INDUSTRIE

Cette rubrique n'engage pas la responsabilité de la rédaction

Médecine & Hygiène
Département publicité
Chemin de la Mousse 46
Case postale 475
1225 Chêne-Bourg
Tél. 022 702 93 41
Fax 022 702 93 43
pub@revmed.ch

contact :

••••• Votre nouvelle solution en cas de dyspepsie et de côlon irritable : Iberogast®

La dyspepsie et le côlon irritable sont des affections chroniques très fréquentes, leur prévalence se situant autour de 25%.¹ Pour le traitement, vous disposez maintenant d'un nouvel «evidence-based» médicament de Permamed : Iberogast.

Iberogast est plus qu'un prokinétique, car il a un effet :

- prokinétique en cas d'hypomotilité² (spécifique à la région)
- spasmolytique en cas d'hypermotilité² (spécifique à la région)
- analgésique en cas d'hypersensibilité gastro-intestinale.^{3,5}

Bilan des études sur Iberogast :

- effet significatif documenté dans cinq études contrôlées GCP-conformes chez des femmes et des hommes souffrant de dyspepsie et de côlon irritable⁴⁻⁸
- mieux toléré et aussi efficace que les prokinétiques (métoclopramide, cisapride)^{6,9}
- très faible taux d'effets secondaires : 0,4% de 5951 patients d'études.

Posologie/mode d'emploi :

20 gouttes 3 x/jour (dès 12 ans), 15 gouttes 3 x/jour (6-12 ans) avant ou pendant les repas par exemple dans un peu d'eau.

Important : agiter avant l'emploi.

Durée minimale recommandée du traitement :

8 semaines;⁸ à raison de 2 x 100 ml d'Iberogast.

Conseil : 20 ml à emporter dans la poche (= 18 dosages normaux à 20 gouttes).

Présentation : 20 ml, 50 ml, 100 ml.

Information professionnelle en bref

C: *Iberidis amarae recentis extractum ethanolicum liquidum* (6 : 10) 0,15 ml; *extracta ethanolica liquida* (3,5 : 10) : *angelicae radices* 0,1 ml; *cardui mariae* 0,1 ml; *carvi* 0,1 ml; *chelidonii herbae* 0,1 ml; *liquiritiae* 0,1 ml; *matricariae* 0,2 ml; *melissae* 0,1 ml; *menthae piperitae* 0,05 ml, ad solutionem pro 1 ml corresp. ethanolicum 31% V/V. **I:** Troubles gastro-intestinaux fonctionnels (dyspepsie et côlon irritable) **PO:** Adultes et adolescents dès 12 ans : 20 gouttes 3 fois par jour avant ou pendant les repas dans un peu d'eau. Enfants dès 6 ans : Sur ordonnance pour les enfants de 6 à 12 ans : 15 gouttes 3 fois par jour. Agiter le flacon avant l'emploi. **G:** Pas de données cliniques. **EI:** Très rares : réactions d'hypersensibilité (éruption cutanée, dyspnée ou troubles circulatoires). **P:** 20 ml, 50 ml et 100 ml. Liste C.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Compendium suisse des médicaments.

Nouveau !



Références :

- 1 Beglinger C. Funktionelle Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, Uni-med Verlag, Bremen, 3. Auflage, 2007.
- 2 Pilichiewicz AN, et al. Effects of Iberogast on proximal gastric volume, antropyloroduodenal motility and gastric emptying in healthy men. *Am J Gastroenterol* 2007;102:1-8.
- 3 Liu CY, et al. The herbal preparation STW5 (Iberogast) desensitizes intestinal afferents in the rat small intestine. *Neurogastroenterol Motil* 2004;16:759-64.
- 4 Buchert D, et al. Wirkung einer fixen Kombination bei gesicherter Non-Ulcus-Dyspepsie. *Z Phytother* 1994;15:24-5.
- 5 Madisch A, et al. Ein Phytotherapeutikum und seine modifizierte Rezeptur bei funktioneller Dyspepsie. *Z Gastroenterol* 2001;39:511-7.
- 6 Rösch W, et al. A randomised clinical trial comparing the efficacy of a herbal preparation STW5 with the prokinetic drug Cisapride in patients with dysmotility type of functional dyspepsia. *Z Gastroenterol* 2002;40:401-8.
- 7 Madisch A, et al. Treatment of irritable bowel syndrome with herbal preparations : Results of a double-blind, randomized, placebo-controlled, multicentre trial. *Aliment Pharmacol Ther* 2004;19:271-9.
- 8 Von Arnim U, et al. STW5, a phyto-pharmakon for patients with functional dyspepsia : Results of a multicenter, placebo-controlled double-blind study. *Am J Gastroenterol* 2007;102:1268-75.
- 9 Raedsch M, et al. Wirksamkeit und Unbedenklichkeit des Phytopharmakons STW5 versus Metoclopramid bei funktioneller Dyspepsie unter Praxisbedingungen – eine retrospektive Kohortenstudie. *Z Gastroenterol* 2007;45:1-8.

Information :

Permamed
Division Vitalis
4106 Therwil
Tél. 061 725 20 20
Fax 061 725 20 40
p.huber@permamed.ch
www.permamed.ch



Qualité naturelle exceptionnelle